

Nombre de la paciente: Sofía Campos

 Fecha de nacimiento: 7 / Feb / 1980 Teléfono: (55) 5555-5555

 Dirección: Carr. Guadalajara Chapala Km 17.5, 45659 Correo electrónico: sofia@campos.com

 Número de SUS: 7293817211 Fecha: 10 / Ago / 2018

 Nombre del operador: Juan Gutiérrez Firma del operador: Juan Gutiérrez

A continuación te presentamos los resultados de la prueba de tamizaje que te acabas de realizar. En este reporte encontrarás el cuestionario que contestaste antes de la prueba, información acerca del cáncer cervicouterino, factores de riesgo, así como tu resultado y lo que significa.

Cuestionario pre-tamizaje

- ¿La paciente está embarazada o cree estar embarazada? Sí No
- ¿A la paciente se le ha realizado el Papanicolaou en las últimas 6 semanas? Sí No
- ¿La paciente ha dado a luz en los últimos 4 meses? Sí No
- ¿La paciente está en los primeros 3 días de su ciclo menstrual con flujo abundante? Sí No
- ¿La paciente ha recibido tratamiento quirúrgico en el cuello uterino en los últimos tres meses? (incluyendo biopsias por punción). Sí No
- ¿La paciente ha recibido radioterapia en la región pélvica en el pasado? Sí No
- ¿La paciente está recibiendo o ha recibido quimioterapia en las últimas 5 semanas? Sí No
- ¿A la paciente se le ha realizado una histerectomía? Sí No
- ¿La paciente tiene alguna infección aguda o sub-aguda clínicamente aparente en el cuello uterino o vagina? Sí No
- ¿La paciente tiene alguna enfermedad fotosensibilizante o está recibiendo terapia fotodinámica o está expuesta a medicamentos fotosensibilizantes? Sí No

Síntomas presentes en la paciente

- Secreción vaginal Sí No
- Sangrado post-coito Sí No
- Sangrado vaginal/cervical irregular No Bajo Regular Alto

Otro: **No se encontró sangrado vaginal en la paciente.**

Registro de Inspección del Operador

Uniforme	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	Quiste de Naboth	<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No
Inflamación	<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No	Desgarro	<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No
Hipertrofia	<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No	Leucoplasia	<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No
Pólipo	<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No	Lesión sospechosa	<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No
Cervicitis:	<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No	Otro:		

¿La paciente es candidata para la prueba InstaPAP®?

 Sí

 No

¿Qué es el cáncer cervicouterino?

El cáncer cervicouterino es una enfermedad por la cual se forman células malignas (cancerosas) en los tejidos del cuello uterino.

Como se muestra en la imagen, el cuello uterino es el extremo inferior del útero (el órgano hueco en forma de pera donde se desarrolla el feto). El cuello uterino comunica el útero con la vagina y está cubierto por una capa delgada de tejido compuesto por células.



Las células saludables crecen, se multiplican y se reemplazan a través del tiempo. El cáncer cervicouterino ocurre cuando se alteran esas células y se multiplican con mayor rapidez. Esto puede causar que aparezcan capas profundas de células o se dispersen a otros órganos. Las células cancerosas posteriormente forman una masa de tejido que se denomina tumor.

El cáncer cervicouterino, por lo general, evoluciona lentamente con el paso del tiempo y tarda varios años en desarrollarse. Durante este tiempo, las células en el cuello uterino o alrededor de éste se vuelven anormales. Los primeros cambios celulares que ocurren antes de que se desarrolle el cáncer se llaman displasia o neoplasia intraepitelial cervical (NIC) y tienen tres grados distintivos, basados en el espesor de la invasión por parte de las células escamosas.

Vista del cuello uterino a través de la vagina



Normal



NIC I



NIC II



NIC III

¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer cervicouterino?

- Infección del Virus del Papiloma Humano (VPH)
- Tener varias parejas sexuales
- Tener una pareja sexual que ha tenido varias parejas sexuales
- Comienzo de las relaciones sexuales a una edad temprana (antes de los 18 años)
- Tener un historial personal de displasia del cuello uterino, de la vagina o la vulva
- Tener un historial familiar de cáncer cervicouterino
- El hábito de fumar

¿Cuáles son los síntomas del cáncer cervicouterino?

El cáncer cervicouterino generalmente no presenta síntomas en su etapa temprana. Para cuando se presentan los síntomas, es posible que las células cancerosas ya se hayan diseminado. Los síntomas incluyen sangrado anormal, manchas de sangre o secreción acuosa de la vagina, el sangrado menstrual podría ser más intenso de lo acostumbrado y puede ocurrir sangrado después de las relaciones sexuales.

¿Se puede prevenir el cáncer cervicouterino?

Una manera comprobada para prevenir el cáncer cervicouterino consiste en hacerse pruebas de detección como ésta. La detección temprana evita a que el precáncer se convierta en cáncer invasivo. De igual manera, evitar la exposición al VPH, vacunarse contra el VPH y no fumar ayudan a prevenir el cáncer cervicouterino.

¿En qué consiste la prueba que se me acaba de realizar?

La prueba InstaPAP® detecta cambios pre-cancerosos o neoplasia intraepitelial cervical (NIC), por medio de mediciones ópticas y eléctricas del tejido cervical. Durante la prueba, el dispositivo tocó varios puntos en tu cuello uterino para captar señales eléctricas y ópticas de los tejidos a través de la transmisión de luz, lo cual permite identificar cambios en el tejido cervical. Entre los cambios que se buscan identificar se encuentran cambios en las capas basales y del estroma, así como aumentos en la circulación de la sangre y variaciones en los vasos sanguíneos que se producen con el cambio pre-canceroso.

Los datos recopilados se comparan con una base de datos integrada de miles de pacientes procedentes de múltiples entornos geográficos y étnicos con diferentes diagnósticos histológicos. Por medio de esta comparación y algoritmos sofisticados se puede distinguir si tu tejido es normal o anormal (canceroso y precanceroso).

Resultado de la prueba

Normal

Anormal

¿Qué significan los resultados de la prueba?

Un resultado *normal* significa que no se encontró ninguna anomalía en el cuello uterino.

Un resultado *anormal* significa que se encontraron anomalías en el cuello uterino, y existe la posibilidad que haya alguna lesión o neoplasia intraepitelial cervical (NIC).

¿Qué debo hacer si mi resultado es normal?

Si tu resultado es *normal*, de acuerdo a la norma de tamizaje establecida por la Secretaría de Salud, se sugiere realizarte una prueba de tamizaje cada tres años. Consulta a tu médico.

¿Qué debo hacer si mi resultado es anormal?

Si tu resultado es *anormal*, tu doctor decidirá cuál es el siguiente paso a seguir. Generalmente se realiza una colposcopia o biopsia para confirmar los resultados y comenzar tratamiento si es necesario.